© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Zwei neue Buliminus Arten aus Centralasien.

Buliminus silvestris n.

Testa cylindrica, striatula, nitida, fulvo-cornea seu castanea, albo strigata, apice conoideo concolori; anfractus 7½ lente crescentes regulares, ultimus ad aperturam paullum ascendens, ad basin leviter conpressus, rotundatus, sutura sat impressa medio obliqua; apertura subauriformis, peristomate undique reflexo, albo, incrassato, margine externo superne angulatim curvato, marginibus callo crasso albo junctis.

Long 13, lat. 4½, dim. apert. 4:3 mm.

Hab. Alatau in valli Karagoin alt. 5 7500.′

Dieser hübsche Buliminus ist von H. Retter in der Karagoinschlucht im Alatau in 5000—7500 m Höhe im Tannenwalde entdeckt worden, leider bloss in 2 Exemplaren, von denen ich 1 Stück Dr. W. Kobelt überlassen; das zweite befindet sich in meiner Sammlung.

Buliminus (Napaeus) karagoinensis n.

Testa rimata, conica, tenera, subtilissime costulata, fulvo-cornea, nitidula, apice obtuso; anfractus 7, convexi, regulariter crescentes, sutura canaliculata medio obliqua; apertura oblonga, basi subangulata, margine exteriori recto, tenui, ab insertione curvato, columellari-verticali, dilatato, reflexo.

Long. 17, lat. 9, ap. dim. 7:4 mm.

Hab. Alatau in valli Karagoin.

Dieser merkwürdige Buliminus, der durch seine dünne Schale und Form von allen aus Centralasien bekannten Buliminus-Arten stark abweicht, ist von Herrn Johannes Retter in der Karagoinschlucht leider bloss in einem Exemplar mit nicht ganz ausgebildetem Aussenrande der

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Mündung gefunden worden, weshalb die Diagnose nicht endgültig sein kann. Das Exemplar befindet sich in meiner Sammlung.

Jekaterinodar, Kaukasus April 1904.

Baron Rosen.

Litteratur.

Simroth, Prof. Dr., Philomyciden und Arioniden. Separat-Abdruck aus den Sitzungsberichten der Naturforsch. Gesellschaft zu Leipzig, 14. Januar 1903, p. 32—45. Neue Arten: Philomycus balius, Tonkin; tonkinensis, Tonkin; taiwanensis, Formosa; doederleini, Liu-kiu; melachloros, Tsu-shima; viperinus, Japan.

Simroth, Prof. Dr., Ueber die von Herrn Dr. Neumann in Abessinien gesammelten aulacopoden Nacktschnecken. Abdruck aus den Zoolog. Jahrbüchern für Systematik, Geographie etc. 16. Bd., Heft 6 1903, p. 673—726. Mit 4 Taf. und 4 Textfig.

Neue Arten: Agriolimax afer, uataderensis, gardullanus, gofanus, glandulosus, koschanus, kortanus, concrementosus, kaffanus, abessinicus, deckeni, gimirranus, fuscus, limacoides, sämtlich aus den verschiedenen Landschaften des Gebietes; ferner; Atoxon erlangeri und Spiritoxon, Vorkommen wie vorsteht. Weiter Spiritoxon stuhlmanni, Ostafrika. Und endlich Varania loennbergi n. g und n. sp. von Kamerun, entdeckt in dem Magen eines Waran den Herr Loenberg aus Upsala an Ort und Stelle in Kamerun zu seinem Studium herausgenommen und in Formol gelegt.

Collinge, Walter E., Report on the non-operculate Land Mollusca, in Fasciculi Malayenses — Zoology — Vol. 1 von Herbert C. Robinson.

Neu Damayantia minima, Parmarion malayana, Hemiplecta salangana v, Mts. var. martensi, Amphidromus perakensis Fult. var. globosus Fult. Alopos maximus (the largest and finest example of the genus) 130 mm. in Alcohol, und noch zwei unbeschriebene, weil nur je 1 Stück, Veronicella. 3 Tafeln.